



BỆNH DỊCH HẠCH VÙNG PHỔI

Bệnh dịch hạch là một chứng bệnh lây nhiễm xảy ra ở thú vật và người, do loại vi khuẩn *Yersinia pestis* gây ra. Vi khuẩn này được tìm thấy ở các loài động vật gặm nhấm và những con bọ chết sống trên các loài động vật này ở nhiều nơi trên thế giới.

Các triệu chứng

Bệnh dịch hạch ở phổi xảy ra khi vi khuẩn *Y. pestis* nhiễm vào phổi. Các dấu hiệu đầu tiên cho thấy bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch vùng phổi là sốt, đau đầu, suy nhược và ho ra máu hoặc đờm loãng. Bệnh viêm phổi tiến triển từ hai tới bốn ngày và có thể gây sốc do nhiễm khuẩn, và tử vong nếu không được chữa trị sớm.

Lây nhiễm

Bệnh dịch hạch vùng phổi lây nhiễm từ người này sang người khác qua các hạt nước bắn ra khi hô hấp, các hạt nước này chỉ nhiễm sang những người có tiếp xúc trực diện với bệnh nhân.

Chủng ngừa/Ngừa bệnh

Không có thuốc chủng ngừa bệnh dịch hạch. Biện pháp điều trị ngừa bệnh bằng thuốc trụ sinh trong bảy ngày sẽ giúp bảo vệ những người có tiếp xúc trực diện với những người bị nhiễm bệnh.

Điều trị

Việc điều trị bệnh dịch hạch vùng phổi ngay từ đầu là rất quan trọng. Nhiều loại thuốc trụ sinh có công dụng tốt, trong đó bao gồm streptomycin, tetracycline và chloramphenicol.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi Bộ Y Tế Tiểu Bang North Dakota (North Dakota Department of Health) tại số 701.328.2378.